

دمہ کے انہیلرز۔ ادویات اور علاج

ریلیور انہیلر - 'آپ کے بچے کا ایمرجنسی ریسکیو ریلیور'

دمہ میں مبتلا ہر شخص کو ہمیشہ ایک ریلیور (ہلیو انہیلر) انہیلر ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ یہ ایمرجنسی میں دستیاب رہے۔


- ریلیور (نیلے) انہیلر میں موجود دوا کو سلیوٹامول کہتے ہیں۔
- یہ سانس لینے کی تنگ ٹیوبوں کو آرام دے کر اور کھول کر کام کرتا ہے اور اس طرح یہ دمہ کے دورے کی علامات کو کم کرتا ہے۔ آپ کے بچے کو کچھ منٹس میں ہی اپنی سانس لینے کے عمل میں فرق محسوس ہونا چاہئے۔
- اگر انہیلر اپنے ریلیور انہیلر کی ہفتے میں تین سے زیادہ دفعہ ضرورت پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دمہ اچھی طرح سے کنٹرولڈ نہیں ہے جتنا کہ یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو چاہئے کہ اپنے بچے کے علاج کا اس کے ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ ریویو کروائیں۔
- ریلیور انہیلر کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔
 - 0 میٹرڈ ڈوزز انہیلرز (MDIs)، جیسا کہ وینٹولین، ایٹرومیر، سلامول۔ اگر آپ کے بچے کو MDI انہیلر تجویز کیا گیا ہے تو اسے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سپیئر کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی دوا اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ رہی ہے۔
 - 0 بریتھ ایکچویٹڈ انہیلرز (BAIs)، جیسا کہ ایزیریڈھ، ایٹرمینک، آٹوبیلر۔
 - 0 ڈرائی پاؤڈر انہیلرز (DPIs)، جیسا کہ اکیوبیلر
- یہ اہم ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ بات کریں کہ کونسا آپ کے بچے کے لئے مناسب ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ پھیپھڑوں کے اندر دوا کی صحیح مقدار پہنچا سکیں۔
- اگر آپ کے بچے کا دمہ ورزش سے ٹریگر ہوتا ہے، تو وہ علامات کی روک تھام کے لئے اپنا ریلیور انہیلر ورزش شروع کرنے سے 20 منٹ پہلے لے سکتا ہے۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- 0 ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور زندگیاں بچانے کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
- 0 چونکہ سلیوٹامول براہ راست پھیپھڑوں کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس کا سبب بنے۔
- 0 تاہم، یہ ممکن ہے کہ آپ کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں میں لرزش یا تیز دھڑکتے ہوئے دل کا تجربہ ہو۔



سپیسرز آپ کے پھیپھڑوں میں دوا کی صحیح مقدار پہنچانا آسان بناتے ہیں۔



- سپیسرز بڑے، خالی ڈیوائسز یعنی آلات ہیں جو آپ کے بچے کو دمہ کی دوا کی صحیح مقدار کو صحیح جگہ (پھیپھڑوں) تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اگر وہ میٹرڈ ڈوز انہیلر (MDI) استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی علامات کو بہتر مینج کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے مجموعی طور پر کم دوا استعمال کرنے کی ضرورت ہو۔
- سپیسرز ڈیوائس کے استعمال سے آپ کے بچے کی دوا سے سائیڈ ایفکٹس کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ کچھ دوا اس کے پھیپھڑوں کے بجائے اس کے منہ یا گلے کے پچھلے حصے میں جا سکتی ہے اگر وہ سپیسر ڈیوائس استعمال نہیں کرتے ہیں۔
- سپیسرز کے کئی مختلف برانڈز اور سائز ہیں جو مختلف انہیلر اور مختلف عمر کے گروپوں کو فٹ آتے ہیں۔ اگر آپ شوور نہیں ہیں کہ آپ انہیلر اور سپیسرز صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہیں، تو مدد حاصل کرنے کے لئے کئی جگہیں ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں۔
 - اپنی دمہ کی نرس سے رابطہ کریں
 - اپنے فارماسسٹ سے بات کریں
 - www.beatasthma.co.uk پر معلوماتی اوراق اور ویڈیوز ملاحظہ کریں۔
- یہ اہم ہے کہ آپ اپنے بچے کے سپیسرز کو صاف کرتے ہوئے ہدایات پر عمل کریں۔ اگر یہ ایک نیا سپیسر ہے، تو اسے صاف کریں اس سے پہلے کہ آپ اسے پہلی دفعہ استعمال کریں، پھر اس کے بعد ہر مہینے ایک دفعہ استعمال کیا کریں۔
- آپ کے بچے کے سپیسرز کو سال میں کم از کم ایک دفعہ تبدیل کیا جانا چاہئے۔

- پریونٹر انہیلر میں ایئر ویز میں سوزش، سوجن اور حساسیت کو کم کرنے کے لیے سٹیرائڈز کی دوا ہوتی ہے، اور اس طرح، دمہ کے دوروں کی تعداد کو کم کرتی ہے۔
- آپ کے بچے کو اسے استعمال کرنا چاہئے چاہے وہ اچھا ہی کیوں نہ محسوس کرے کیونکہ سٹیرائڈز کی دوا آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو کر آپ کے ایئر ویز کو تحفظ فراہم کرنے میں وقت لیتی ہے۔
- اگر آپ کا بچہ اپنے پریونٹر انہیلر کو لینا بند کر دیتا ہے تو اسے مکمل فوائد حاصل نہیں ہوں گے اور اس کے ایئر ویز کے دمہ کے ٹریگرز یعنی محرکات پر آسانی سے رد عمل ظاہر کرنے کا امکان رہتا ہے۔
- پریونٹر انہیلر دمہ کے دورے کے دوران وہیزنگ (WHEEZING) یعنی سینے سے سیٹی جیسی آواز آنے یا سانس چڑھنے میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے کو اس کے لیے اپنا 'ریلیور' انہیلر (بلیو سلبوٹامول انہیلر) استعمال کرنا چاہیے۔
- پروینٹیو انہیلر کی بہت سی قسمیں ہیں جو تمام شکلوں، سائز اور رنگوں میں آتی ہیں۔ یہ امکان ہے کہ آپ کے بچے کو براؤن انہیلر سے شروع کیا جائے گا، لیکن یہ والا نارنجی رنگ میں بھی آ سکتا ہے۔
- اگر آپ کے بچے کو گلابی، سرخ، پیلا، جامنی، یا سرمئی رنگ کا انہیلر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ایک کمینیشن انہیلر دیا گیا ہے، جس میں دیر تک کام کرنے والی ریلیور دوا بھی ہوتی ہے۔
- کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟
 - 0 ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور زندگیاں بچانے کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
 - 0 حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پریونٹر انہیلر دوا کی کم خوراک لینے سے سائیڈ ایفیکٹس یعنی مضر اثرات کا امکان کم ہوتا ہے۔
 - 0 یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے تجویز کردہ مرضی کے مطابق روزانہ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو ریلیور انہیلر یا اورل سٹیرائڈ گولیوں کے ریپیٹ پریسکرپشن کی ضرورت کم پڑے گی ہے جس کا مطلب ہے سٹیرائڈز کی زیادہ مقدار۔
 - 0 کچھ عام سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں:
 - گلے کی خراش کھردری آواز، منہ کا انفیکشن جسے تھرش کہتے ہیں۔
 - 0 ان سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے طریقے:
 - MDI انہیلر کے ساتھ سپیسر کا استعمال
 - انہیلر کے اچھے طریقے استعمال کرنا
 - اپنے انہیلر کو استعمال کرنے کے بعد اپنے منہ میں گلی کرنا اور اپنے دانتوں کو برش کرنا
 - 0 دمہ کے ریویو کے دوران ہمیشہ آپ کے بچے کے قد اور وزن کی پیمائش کی جائے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ زیادہ مقدار میں سانس لینے والے سٹیرائڈز کے طویل مدتی استعمال اور نشوونما میں کمی کے درمیان ایک چھوٹا سا ربط ہے۔



طویل مدتی عمل والے (لانگ ایکٹنگ) ریلیور انہیلرز

- آپ کے بچے کو 'ایڈ آن' علاج کے طور پر طویل مدتی اثر والے ریلیور انہیلر دیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کے بچے کے معمول کے یومیہ پریوینٹیو انہیلر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ سانس لینے والی نالیوں کے ارد گرد کے پٹھوں کو آرام دے کر ایئر ویز کو کھلا رکھا جا سکے اور اس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔
- طویل عرصے تک کام کرنے والے ریلیور انہیلر کو صرف استعمال کیا جانا چاہئے اگر آپ کے بچے کو روزانہ استعمال کرنے کے لئے ایک سٹیرائیڈ پریوینٹر انہیلر بھی تجویز کیا گیا ہو۔ سٹیرائیڈ پریوینٹیو انہیلر کا استعمال کیے بغیر طویل مدتی ریلیور انہیلر کا استعمال خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل وقت تک کام کرنے والا ریلیور انہیلر اس کی ایئر ویز میں چھپی سوزش (سوزش آپ کے بچے کی ایئر ویز کو زیادہ حساس اور ایریٹیل یعنی معمولی چیز سے خراب ہونے والی بناتی ہے) کا علاج نہیں کرتا ہے۔ سٹیرائیڈ پریوینٹیو انہیلر کے ساتھ ملائے بغیر، نیچے موجود سوزش مزید خراب ہو جائے گی۔
- لانگ ایکٹنگ ریلیور انہیلر کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔
 - لانگ ایکٹنگ بیٹا اگونسٹس (LABA)، ان کی مثالیں یہ ہیں: سیریونٹ ایوبیلر (سالمیٹرول)، ورٹائن میٹرڈ-ڈوز انہیلر (سالمیٹرول)، فورموٹیرول ایزی بیلر (فورموٹیرول)، اوکسس ٹربویلر (فورموٹیرول) اور فورادل ڈرائی انہیلر (فورموٹیرول)۔
 - لانگ-ایکٹنگ مسکارینک رسیپٹر اینٹاگونسٹس (LAMA)، ان کی مثالیں یہ ہیں: سپیریو ریسپیمیٹ (ٹایوٹروپئم برومائید)
- یہ اہم ہے کہ آپ اپنے بچے کے ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ بات کریں کہ کونسا آپ کے بچے کے لئے مناسب ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ پھیپھڑوں کے اندر دوا کی صحیح مقدار پہنچا سکیں۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور زندگیاں بچانے کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
- چونکہ لانگ ایکٹنگ ریلیور براہ راست پھیپھڑوں کو پہنچایا جاتا ہے، تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس کا سبب بنے۔
- آپ کے بچے کو شاید مندرجہ ذیل میں سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوں جب وہ پہلی دفعہ یہ انہیلرز لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ عموماً معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں اور چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کے بچے کا جسم اس کے ساتھ عادی ہوتا جاتا ہے۔
- آپ کے بچے کو ان میں سے کچھ ایفیکٹس شاید ہوں یا نہ ہوں، جیسا کہ سر چکرانا، سردرد، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش۔ کبھی کبھار کچھ اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ یہاں درج نہیں ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا دمے کی نرس یا فارماسسٹ سے رابطہ کریں، اگر آپ کا بچہ کوئی غیر معمولی چیز نوٹس کرے یا آپ کو کوئی تشویش ہو۔

طویل مدتی عمل والے (لانگ ایکٹنگ) ریلیور انہیلرز

ٹایوٹروپئم برومائید



کمبینیشن انہیلرز میں دو قسم کی دوا ہوتی ہے (پریوینٹر + لانگ ایکٹنگ ریلیور)

- آپ کا بچے کو کمبینیشن انہیلرز اس لئے لکھی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے دمے کی علامات معمول کی دواؤں سے صحیح طور پر قابو میں نہیں آ رہیں۔
- اس میں دو قسم کی دوا ہوتی ہے:
 - o ایک لانگ ایکٹنگ ریلیور اور ایک سٹیرائیڈ پریوینٹر
 - o مثالیں: سپیریٹائیڈ، سیمبیکورٹ یا فوسٹائر
- کمبینیشن انہیلرز دمہ کے دورے کے دوران گھر گھراہٹ یا سانس چڑھنے میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے کو اس کے لیے 'ریلیور' انہیلرز (بلیو سلبوٹامول انہیلرز) استعمال کرنا چاہیے۔
- آپ کے بچے کو روزانہ اپنا کمبینیشن انہیلرز لینا چاہئے چاہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ محسوس کریں۔ یہ اس لئے ہے کیونکہ یہ ایسے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ یہ ایئر ویز کی سوزش کو روکنے کے لئے پس منظر میں کام کرتے ہیں۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- o یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے تجویز کردہ مرضی کے مطابق روزانہ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو ریلیور انہیلرز یا اورل سٹیرائیڈ گولیوں کے ریپیٹ پریسکرپشن کی ضرورت کم پڑے گی ہے جس کا مطلب ہے سٹیرائڈز کی زیادہ مقدار۔
- o کچھ عام سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں:
 - گلے کی خراش کھردری آواز، منہ کا انفیکشن جسے تھرش کہتے ہیں۔

ان سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے طریقے:

- MDI انہیلرز کے ساتھ سپیسر کا استعمال
- انہیلرز کے اچھے طریقے استعمال کرنا
- اپنے انہیلرز کو استعمال کرنے کے بعد اپنے بچے کے منہ میں گلی کروانا اور اس کے دانتوں کو برش کرنا
- o دمے کے ریویو کے دوران ہمیشہ آپ کے بچے کے قد اور وزن کی پیمائش کی جائے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ زیادہ مقدار میں سانس لینے والے سٹیرائڈز کے طویل مدتی استعمال اور نشوونما میں کمی کے درمیان ایک چھوٹا سا ربط ہے۔



یہ علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو پریوینٹیو اور ریلیور کو یکجا کرتا ہے۔

- آپ کے بچے کو ایک خاص قسم کا ریجیم (طریقہ علاج) لکھا جا سکتا ہے جسے 'Maintenance' (MART) (and Reliever Therapy) کہا جاتا ہے جس میں پریوینٹر اور ریلیور دونوں ہوتے ہیں۔
- برطانیہ میں مختلف مارٹ (MART) برانڈز استعمال کیے جاتے ہیں لیکن Symbicort SMART Regime وہ واحد ریژیم ہے جو اس وقت بڑے ٹین ایجرز (20 سال سے کم) کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔
- یہ عمومی طور پر زیادہ سخت دمے کے لئے دیا جاتا ہے یا ایسے فرد کو جسے شاید زیادہ ڈوز کے استعمال کے قابل ہونے سے فائدہ ہو (مجوزہ ڈوز کی سب سے زیادہ مقدار تک) جو وہ سارا دن لیتے ہیں اس وقت جب انہیں بگڑتی ہوئی علامات کا سامنا ہو۔
- آپ کے بچے کو روزانہ اپنا مارٹ (MART) انہیلر لینا چاہئے چاہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ محسوس کریں۔ یہ اس لئے ہے کیونکہ یہ ایسے بنائے گئے ہوتے ہیں کہ یہ ایئر ویز کی سوزش کو روکنے کے لئے پس منظر میں کام کرتے ہیں۔
- جب آپ کا بچہ مارٹ (MART) ریجیم پر ہو، تو آپ کے بچے کو ایمرجنسی علامات کے لئے ریلیور انہیلر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب علامات بگڑ جائیں، آپ کے بچے کو اپنے مارٹ (MART) انہیلر کی مقدار اپنے مخصوص MART ایکشن پلان کے مطابق بڑھانی چاہئے۔ آپ کے بچے کو پھر بھی ہمیشہ اپنے ساتھ ریلیور انہیلر (نیلا انہیلر) ہر وقت رکھنا چاہئے۔
- کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟
 - یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے تجویز کردہ مرضی کے مطابق روزانہ استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلیور انہیلر یا اورل سٹیرائیڈ گولیوں کے ریپیٹ پریسکرپشن کی ضرورت کم پڑے گی جس کا مطلب ہے سٹیرائڈز کی زیادہ مقدار۔
 - کچھ عام سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں:
 - گلے کی خراش کھردری آواز، منہ کا انفیکشن جسے تھرش کہتے ہیں۔
 - ان سائیڈ ایفیکٹس سے بچنے کے طریقے:
 - انہیلر کے اچھے طریقے استعمال کرنا
 - اپنے انہیلر کو استعمال کرنے کے بعد اپنے بچے کے منہ میں گلی کروانا اور اس کے دانتوں کو برش کرنا
 - دمے کے ریویو کے دوران ہمیشہ آپ کے بچے کے قد اور وزن کی پیمائش کی جائے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ زیادہ مقدار میں سانس لینے والے سٹیرائڈز کے طویل مدتی استعمال اور نشوونما میں کمی کے درمیان ایک چھوٹا سا ربط ہے۔

سنگولیئر/مونٹیلوکاسٹ (Leukotriene Receptor Antagonists (LTRAs))

LTRAs کو پریونٹر انہیلر کی ایک اور قسم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سٹیرائیڈز نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے معمول کے دمے کی ادویات کے ساتھ 'ایڈ آن (add-on)' کے طور پر کام کرتے ہیں۔



- آپ کے بچے کو ایک دوا لکھی جا سکتی ہے جسے 'لیوکو ٹرین ریسپٹر انٹاگونسٹس (LTRAs)' کہتے ہیں۔
- LTRAs جسم میں ان کیمیکلز کے اثرات کو بلاک کرنے کے ذریعہ کام کرتے ہیں جو ایئر وے یعنی سانس کی نالی میں سوزش اور ان کو تنگ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آپ کے بچے کے جسم کے اس رد عمل کو بھی کم کرتے ہیں جو وہ ان چیزوں (الرجنز) سے سامنے ہونے کی صورت میں دکھاتا ہے جو اس کے دمہ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔
- LTRAs باقاعدگی سے لینے سے آپ کے بچے کو دمے کے دوروں کو روکنے میں مدد ملے گی۔
- اس میں 2 ہفتوں تک لگ سکتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کا بچہ LTRAs کے مکمل اثرات کو محسوس کرنے لگے۔ تاہم، اگر 6 ہفتے کے بعد اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر شاید LTRAs اس کے لئے صحیح دوا نہیں ہے۔ دوا لینا بند کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا دمے کی نرس سے بات کریں۔
- LTRAs دمہ کے دورے کے دوران وہیزنگ یا سانس چڑھنے میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے کو اس کے لیے اپنا 'ریلیور' انہیلر (بلیو سلبوٹامول انہیلر) استعمال کرنا چاہیے۔
- LTRAs کی سب سے عام اقسام مونٹیلوکاسٹ (Montelukast) (ایک برانڈ کا نام ہے اور واحد ہے) ہے۔ کچھ اوقات آپ کے بچے کو زفیروکاسٹ (برانڈ کا نام ایکولیٹ) بھی تجویز کیا جاسکتا ہے۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- o ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
- o جو بچے LTRAs لیتے ہیں ان کے کچھ عام سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں:
 - الٹیاں، جھنجھلاہٹ، ڈراونے خواب
 - اگر آپ کے بچے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں، یا آپ کسی بھی چیز کے متعلق فکرمند ہوں تو اپنے ڈاکٹر دمے کی نرس یا فارماسسٹ سے بات کریں۔

- 0 جو ٹین ایجرز LTRAS لیتے ہیں ان کے کچھ عام سائیڈ ایفکٹس میں شامل ہیں:
- گلے کا اکثر خراب رہنا، انفیکشن۔ (10 میں سے 1 فرد کو یہ ہوسکتے ہیں)
- متلی، الٹی، یرقان (آپ کی جلد یا آنکھوں کی سفیدی کا پھیلا پڑنا)
- اگر آپ کسی بھی چیز کے متعلق فکر مند ہوں تو اپنے ڈاکٹر دمے کی نرس یا فارماسسٹ سے بات کریں۔

تھیوفیلین (Theophylline)

تھیوفیلین ایک 'ایڈ آن' علاج ہے جو آپ کے ایئر ویز میں پٹھوں کو آرام دے کر آپ کے بچے کی سانس کی تکلیف کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے تاکہ ہوا ان کے ذریعے آسانی سے آ جا سکے۔ اس میں سٹیرائیڈز نہیں ہوتے۔

- آپ کے بچے کو ایک دوا لکھی جا سکتی ہے جسے تھیوفیلین (Theophylline) کہتے ہیں۔ یہ اس کے معمول کی دوا کے ساتھ ایک 'ایڈ آن' ہے اور یہ اس کے زیر استعمال دوا کے جگہ نہیں لیتا۔
- تھیوفیلین (Theophylline) ایئر ویز میں پٹھوں کو آرام دے کر کام کرتی ہے تاکہ وہ کھل جائیں اور ان کے ذریعے ہوا زیادہ آسانی سے آ جا سکے۔
- یہ بہت اہم ہے کہ آپ کا بچہ باقاعدگی سے اور صحیح طریقے سے تھیوفیلین (Theophylline) لے جیسا کہ تجویز کیا گیا ہو کیونکہ یہ اس پر دمے کے دورے روکنے میں مدد دے گی۔
- آپ کے بچے کو شاید باقاعدہ خون ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے خون میں تھیوفیلین (Theophylline) ایک محفوظ سطح پر ہے۔
- تھیوفیلین (Theophylline) دمے کے دورے کے دوران وہیزنگ یا سانس چڑھنے میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے کو اس کے لیے اپنا 'ریلیور' انہیلر (بلیو سلبوٹامول انہیلر) استعمال کرنا چاہیے۔
- تھیوفیلین (Theophylline) ادویات کی 2 اقسام ہیں۔
 - 0 ایک گولی یا کیپسول جو آپ کا بچہ اپنے دمے کی علامات کو مینج کرنے کے لئے لیتا ہے۔
 - 0 ایک ایمرجنسی دوا جو کہ صرف ہسپتال میں ہی براہ راست رگوں کے ذریعہ دیا جاتا ہے (یعنی انجیکٹ کر کے)۔
- چونکہ یوکے میں تھیوفیلین (Theophylline) کی دوسری برانڈز بھی استعمال کی جاتی ہیں، اس لئے یہ یقینی بنانا بہت اہم ہے کہ ہر دفعہ جب آپ اپنے بچے کے لئے دوا لانے جائیں آپ تھیوفیلین (Theophylline) کا ایک ہی برانڈ لیں کیونکہ دوا کی مقدار جو آپ کے بچے کا جسم جذب کرے گا وہ مختلف برانڈز میں مختلف ہو سکتا ہے۔
- اس سے میں 6 ہفتوں تک لگ سکتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کا بچہ تھیوفیلین (Theophylline) کے مکمل اثرات کو محسوس کرنے لگے۔ تاہم، اگر 6 ہفتے کے بعد اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر شاید تھیوفیلین (Theophylline) اس کے لئے صحیح دوا نہیں ہے۔ دوا لینا بند کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا دمے کی نرس سے بات کریں۔
- آپ کے بچے کے طرز زندگی کا کچھ حصہ تھیوفیلین کے ساتھ انٹرایکٹ (تعامل) کر سکتا ہے؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون میں تھیوفیلین (Theophylline) کی سطح اوپر

(امکانی طور پر مضر) یا کم ہو سکتی ہے (یعنی کام نہیں کرے گی)۔ اگر آپ کا بچہ تھیوفیلین (Theophylline) لے رہا ہے، تو یہ جاننا اہم ہے کہ وہ انٹرایکٹ (تعامل) کر سکتا ہے
0 شراب، تمباکو، کیفین، سینٹ جون وورٹ (جڑی بوٹیوں والی دوائی)، کچھ اینٹی بائیوٹکس، اور کچھ نشہ آور ادویات کے ساتھ۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- 0 ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
- 0 ممکنہ سائیڈ میں ہو سکتے ہیں:
 - سرد نہ سو سکتا، متلی، جھنجھلاہٹ، خراب معدہ۔
 - الٹی، تیز دھڑکتا ہوا دل، یہ احساس کہ آپ کے دل بے ترتیب طور پر دھڑک رہا ہے، دورے، جلد پر ریش (سرخ ہونا اور چھوٹے دانے نکلنا)۔

پریڈنسی سولون (Prednisolone) (سٹیرائیڈز) – انہیں طویل مدتی بنیاد پر استعمال کرنا

اگر آپ کا بچہ لمبے عرصے سے پریڈنسی سولون (Prednisolone) لے رہا ہے، تو اچانک دوا بند نہ کریں، کیونکہ آپ کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اپنے بچے کے پریڈنسیولون کو بند کرنے سے پہلے ہمیشہ اس کے ڈاکٹر سے بات کریں۔

- آپ کے بچے کو پریڈنسیولون نامی دوا لکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسے ادویات کی فیملی سے ہے جنہیں سٹیرائیڈز کہا جاتا ہے۔ پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں پڑھتے وقت آپ نے سٹیرائیڈز کے بارے میں سنا ہوگا۔ سٹیرائیڈز آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹی مقدار میں سٹیرائیڈز کا استعمال دمہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- دمہ کے شکار بہت سے لوگوں کو دمہ کے دورے کے دوران سٹیرائیڈز (پریڈنسیولون) کے مختصر کورسز لینے کی ضرورت ہوگی۔
- تاہم، سنگین دمہ والے افراد کی ایک چھوٹی سی تعداد کو باقاعدگی سے اور طویل عرصے تک prednisolone لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ سانس کی نالیوں میں سوزش کو آرام پہنچا کر اور سوزش روک کر دمہ کے حملوں کو روکنے میں مدد مل سکے۔
- آپ کے بچے کو دی جانے والی پریڈنسیولون کے کورس کی خوراک اور طوالت آپ کے بچے کی عمر پر منحصر ہوگی، اور اس بات پر کہ اس کے ایئر ویز علاج کو کیا ریسپانس دیتے ہیں اور علامات کیسے بہتر طور پر مینج ہوتے ہیں۔
- آپ کے بچے کا ڈاکٹر کی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ اس کا دمہ کم سے کم ڈوز سے مینج کیا جائے۔ وہ دوسری ادویات کو تجویز کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں جنہیں 'سٹیرائیڈ سپیرنگ (steroid-sparing) ادویات کہا جاتا ہے تاکہ طویل عرصے تک پریڈنسیولون کے استعمال سے بچا جا سکے یا ڈوز کو ممکن حد تک کم رکھا جا سکے اور سائیڈ ایفیکٹس کے خطرات کو کم کیا جائے۔
- پریڈنسیولون عموماً دمہ کی دوسری ادویات کے ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ پریڈنسیولون تجویز کردہ طریقے کے مطابق لی جائے اور یہ کہ آپ کا بچہ پریوینٹر انہیلر کا روزانہ استعمال جاری رکھے۔

- اگر آپ کا بچہ لمبے عرصے سے پریڈنولون (Prednisolone) لے رہا ہے، تو اس کے ڈاکٹر سے مشورہ کئے بغیر اچانک دوا بند نہ کریں، کیونکہ آپ کا بچہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیروائڈ ان کے جسم کے قدرتی سٹیروائڈ ہارمونز کو مختصر وقت کے لیے بننے سے روک سکتا ہے۔
- اگر آپ کے بچے کا ڈاکٹر prednisolone کو روکنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اسے مکمل طور پر روکنے سے پہلے خوراک کو بتدریج کم کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا یقینی بنائیں۔
- کبھی کبھار، اگر آپ کے بچے کا دمہ بہت شدید اور کنٹرول کرنا مشکل ہو تو آپ کے بچے کا ڈاکٹر ایک اور سٹیروائڈ دوا پر بات کر سکتا ہے، جسے کینالوگ (triamcinolone) کہا جاتا ہے۔ یہ دوا عام طور پر کولہوں میں وقفے وقفے سے لگائی جائے گی۔
- آپ کا بچہ چاہے تو اپنے ساتھ ایک سٹیروائڈ ٹریٹمنٹ اینڈ وارننگ کارڈ رکھ سکتا ہے۔ یہ اس کے لئے ریمائنڈر (یاد دہانی) کا کام دے سکتا ہے۔
- بیلٹھ کیئر پروفیشنلز کے لئے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس اور وارننگ کے لئے۔

کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟

- 0 ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
- 0 عین ممکن ہے کہ آپ کے بچے کو سائیڈ ایفیکٹس ہوں اگر وہ پریڈنولون کو طویل مدتی بنیاد پر استعمال کر رہا ہو۔
- 0 سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سوچنا پریشان کن ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا ڈاکٹر صرف اس وقت پریڈنولون تجویز کرے گا جب آپ کے بچے کو جان لیوا دمہ کے حملوں سے روکنا ضروری ہو کیونکہ دمہ کے حملے جان لے سکتے ہیں۔
- 0 ممکنہ سائیڈ میں ہو سکتے ہیں:
 - زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے وزن کا بڑھنا۔
 - نشوونما اور بلوغت پر اثر۔ لڑکیوں میں یہ جسم پر بالوں کے اگنے اور بے قاعدہ ماہواری کا سبب بن سکتا ہے۔ دمے کے ریویو کے دوران ہمیشہ آپ کے بچے کے قد اور وزن کی پیمائش کی جائے گی۔ اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔
 - کمزور مدافعتی نظام، جس کا مطلب شدید انفیکشنز کے خطرے کی زد پر ہونا۔ آپ کے بچے کو کسی بھی ایسے فرد سے دور رہنا چاہیے جسے انفیکشنز ہوں جیسا کہ کم چکن پاکس، شینگلز، خسرہ اگر اسے یہ بیماریاں نہیں ہوئی ہیں یا اسے خسرہ کی ویکسین نہیں لگائی گئی ہے۔
 - ان کی جلد پتلی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہونے میں معمول سے زیادہ وقت لے۔ دھبے (مہاسے) خراب تر ہو سکتے ہیں، اور منہ کے السر یا تھرش (زبان کے فنگل انفیکشن) پیدا ہو سکتے ہیں۔
 - انہیں نیند آنے میں مشکل، موڈ میں تبدیلی، پیٹ میں درد یا سینے کی جلن ہو سکتی ہے۔

اومالیزوماب (Omalizumab)

اومالیزوماب (Omalizumab) (برانڈ نام Xolair) دمہ کی نئی دوائیوں میں سے ایک ہے جو آپ کے بچے کے ایک آپشن ہو سکتی ہے اگر وہ درمیانے درجے والے بے قابو دمے سے لے کر شدید بے قابو دمے میں مبتلا ہو۔ انہیں بھی 'سٹیرائڈ اسپئرنگ' ایجنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

- اگر آپ کے بچے کو شدید الرجیک دمہ ہے تو آپ کے بچے کو اومالیزوماب (Omalizumab) (برانڈ نام Xolair) نامی دوا تجویز کی جا سکتی ہے۔ یہ دمہ کی دوسری ادویات سے بالکل مختلف کام کرتا ہے۔
- اومالیزوماب (Omalizumab) مدافعتی نظام کے بعض کاموں (IgE) کو روک کر کام کرتا ہے جو ایئر ویز میں سوجن کو متحرک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے بچے کا سامنا الرجک ٹریگر سے ہوتا ہے، تو اس کے ایئر ویز اتنے حساس نہیں ہوں گے جتنے پہلے تھے اور اس لیے آپ کے بچے کے بیمار ہونے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
- یہ ہر 2 یا 4 ہفتوں میں جلد کے نیچے دیا جانے والا ایک انجکشن ہے،
- جلد یا خون کا ٹیسٹ یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا اسے الرجی ہے یا نہیں۔
- یہ اس کے معمول کی دوا کے ساتھ ایک 'ایڈ آن' ہے اور یہ اس کے زیر استعمال دوا کے جگہ نہیں لیتا۔ تاہم، اومالیزوماب (Omalizumab) آپ کے بچے کے دمہ کی علامات کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد کر سکتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ سٹیرائڈز کی دوا کم خوراک یا اس سے کم بار لی جا سکے۔
- اومالیزوماب (Omalizumab) دمہ کے دورے کے دوران وہیزنگ یا سانس چڑھنے میں کمی نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے کو اس کے لیے اپنا 'ریلیور' انہیلر (بلیو سلبوٹامول انہیلر) استعمال کرنا چاہیے۔
- کیا اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟
 - 0 ہم آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے اور کے لئے ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے دوسرے ان چاہے اثرات ہوتے ہیں (سائیڈ ایفیکٹس)۔
 - 0 ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کی فہرست پریشان کن لگ سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں ہوں گے
 - 0 ممکنہ سائیڈ میں ہو سکتے ہیں:
 - انجکشن کی جگہ پر کم وقت تک رہنے والی تکلیف
 - بازوؤں اور ٹانگوں میں درد، چکر آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، جلد پر خارش، بڈیوں میں فریکچرز
 - عام زکام والی علامات، سر درد، گلے کی سوزش، آپ کے کان میں درد یا تکلیف، پیٹ میں درد، متلی، الٹی اور ناک سے خون بہنا۔
 - بخار، پھٹوں میں درد اور ریش۔ کچھ لوگوں کو اومالیزوماب لینے کے 1 سے 5 دن بعد یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے کو مطلع کریں کہ آپ کے بچے کو ایسی علامات کا سامنا ہو۔
 - 0 اومالیزوماب (Omalizumab) سے شدید الرجک رد عمل (anaphylaxis) کا ممکنہ خطرہ ہے۔ یہ پہلی خوراک کے بعد، یا کئی خوراکیوں کے بعد ہو سکتا ہے۔ آپ کے بچے کا ڈاکٹر یا نرس الرجک ری ایکشن یعنی رد عمل کی علامات کی قریب سے نگرانی کریں گے جب اسے ایک خاص وقت کے لیے اومالیزوماب دی جا رہی ہوگی۔