

إذا كان طفلك يستخدم جهاز استنشاق وقائي ، فامنحه على النحو الموصوف

طفلك يتحسن. قد لا يزال لديهم أزيز ولكنهم هم:

- التنفس بشكل طبيعي
- سعيد
- نشط
- أعراضهم لا تزداد سوءاً أو تتغير

ابحث عن الأعراض التي تظهر أن طفلك قد يحتاج إلى جهاز الاستنشاق

- سعال مستمر
- ضيق في التنفس
- العمل بجهد أكبر للتنفس
- أزيز متزايد
- أقل نشاطاً أو هدوءاً

إذا كان طفلك يعاني من أعراض ، أعط 2 نفث من جهاز الاستنشاق الأزرق عبر مبادئ.

إذا لم تخففت نفثتان من أعراضهما بعد 5-10 دقائق ، فقم بإعطاء نفثتين أخريين من جهاز الاستنشاق الأزرق عبر فاصل ، واحدا تلو الآخر.

إذا كان 2 نفث لا تزال لا تخفف من أعراضها بعد 5-10 دقائق ، وإعطاء 2 نفث آخر. لديهم الآن ما مجموعه 6 نفث.

يجب أن يشعر طفلك الآن بتحسن ، ويجب أن يستمر هذا لمدة 4 ساعات على الأقل.

يجب أن يعود طفلك إلى طبيعته بعد حوالي 2-3 أيام

ماذا لو لم يتحسن طفلي؟

إذا كان طفلك:

- لا يزال لديه أعراض بعد 6 نفث من جهاز الاستنشاق الأزرق أو
- يحتاج إلى جهاز الاستنشاق الأزرق أكثر من كل 4 ساعات

إنهم لا يتحسنون ، وتحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن.

1. التخلي عن ما يصل إلى 10 نفث من اللون الأزرق جهاز الاستنشاق عبر فاصل ، 1 نفخة في A الوقت.

و
2. ترتيب مراجعة عاجلة مع طبيبه اليوم ، أو اذهب إلى قسم الطوارئ إذا كان هذا غير ممكن.

إذا كان طفلك لا يزال بحاجة إلى 10 نفث من جهاز الاستنشاق الأزرق كل 4 ساعات ، فيجب أن تحصل على مراجعة أكثر إلحاحاً (خلال الساعات القليلة القادمة)

إذا كان طفلك يواجه صعوبة التنفس لا يعفى من 10 نفث من السالبوتامول

يجب عليك الاتصال على 999

و

أثناء انتظار سيارة الإسعاف ، استخدم الفاصل لإعطاء 1 نفخة من جهاز الاستنشاق الأزرق كل 30 ثانية ، مع أخذ 5 أنفاس لكل نفخة تعطى

اتصل بالرقم 999 و 1ive نفخة من جهاز الاستنشاق الأزرق كل 30 ثانية حتى وصول سيارة الإسعاف

يجب أن يتمكن طفلك دائماً من الوصول إلى:

- خطة أزيز فيروسي للحلقات المستقبلية و
- إذا تم وصف جهاز استنشاق وقائي ، فتأكد من مراجعتها في الطبيب العام في غضون 6 أسابيع