

如果你的孩子正在使用预防吸入器，按照

你的孩子正在好转。他们可能仍然有喘息，但他们是：

- 呼吸正常
- 快乐
- 积极

注意表明你的孩子可能需要吸入器的症状

- 持续咳嗽
- 呼吸急促
- 更加努力地呼吸
- 喘息加剧

如果你的孩子有症状，通过储雾罐给2口蓝色吸入器。

如果2口在5-10分钟后没有缓解症状，请通过垫片再喷2口蓝色吸入器，一次一口。

如果2次抽在5-10分钟后仍未缓解症状，

你的孩子现在应该感觉好多了，这应该持续至少4个小时。

你的孩子应该在大约2-3天后恢复正常

如果我的孩子没有好转怎么办？

如果你的孩子：

- 蓝色吸入器抽6口后仍有症状，或
- 每4小时更需要他们的蓝色吸入器

他们没有好转，你现在需要采取行动。

1. 最多放弃10口蓝色通过垫片吸入器，1次抽吸时间。

和

2. 安排紧急审查他们今天的医生，或者去急诊科（如果这是）不可能。

如果你的孩子继续需要每4小时抽10口蓝色吸入器，你应该得到更紧急的检查（在接下来的几个小时内）

**如果您的孩子有困难
呼吸不能通过10口沙丁胺醇缓解**

您应该拨打999

和

在等待救护车时，使用垫片每30秒抽一口蓝色吸入器，每吸一口呼吸5次

您的孩子应始终能够访问：

- 未来发作的病毒喘息计划
- 如果他们被开了预防吸入器，请确保在6周内在全科医生处对其进行审查